

Bijzondere beschermde soorten bij de Leukderbeek



Nationaal beschermd

De **vuursalamander** leeft bij voorkeur in een heuvelachtig gebied met vochtige loofbossen, waar kleine bronbeekjes door het landschap stromen. Paring vindt plaats op het land. Larven worden geboren (tot 3cm). Larven worden afgezet tussen maart en juni. De schaduwrijke plekken met koele, vochtige schuilplaatsen spelen een cruciale rol in het leefgebied. Helder, zuurstofrijk water, zoals beekjes, poelen en putten die gevoed worden door bronwater, zijn van cruciaal belang. De schimmelziekte Bsal vormt een groot risico, deze vreet de huid weg. Hierdoor sterft de salamander.

Alpenwatersalamander komt voor in koelere, natte loofbossen en graslanden met poelen of vijvers. De soort heeft niet snel stromend water nodig om zich voort te planten. De eieren worden afgezet op waterplanten of afgevallen bladeren van de bomen. Er worden tot 150 eieren afgezet, na 10 dagen komend de eieren uit. De schimmelziekte Bsal tast de huid aan. Net als andere salamanders is ook deze soort gevoelig



Nationaal beschermd



Nationaal beschermd

De **gewone bronlibel** komt voor bij bronbeekjes of beschaduwde bovenlopen. De larven leven grotendeels ingegraven in het bodemsubstraat. Nadat de larven tot 5 keer hebben overwintert, sluipen ze uit van eind mei tot begin augustus. Het vrouwtje zet de eieren af op de stille plek in de bedding.

De **levendbarende hagedis** komt voor in open bossen en ruige graslanden, in bermen van (spoor)wegen. Levendbarende hagedissen zijn zoals de naam al zegt eierlevendbarend. De eieren komen in het moederlichaam tot ontwikkeling en komen tijdens of zeer kort nadat ze zijn afgezet uit, met tot wel 8 jongen. De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort die in de genoemde landschapstypen veel wordt aangetroffen op oevers en vochtige terreindelen. Levendbarende hagedissen eten voornamelijk geleedpotigen, waaronder veel spinnen. Ze zijn koudbloedig en hebben de zon nodig om op te warmen.



Nationaal beschermd



Hazelwormen (een pootloze hagedis!) is net als de levendbarende hagedis koudbloedig. Ze leiden een verborgen leven. Het grootste deel van de dag leven ze onder de vegetatie en dood hout of ze verblijven in holen in de grond. De hazelworm heeft een voorkeur voor enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte gebieden, met voldoende zon om op te warmen. Vrouwtjes krijgen tot 15 jongen, die bij de geboorte al tot 10cm lang en volledig zelfstandig zijn. Na 3 jaar vindt voorplanting plaats. De hazelworm kan tot 15 jaar worden en is dan 40cm lang.

Nationaal beschermd

De **das** leeft in allerlei soorten biotopen en is nachtactief. De das is jaarrond actief. De paartijd ligt meestal rond februari. Door een uitgestelde implantatie van de eicel, worden na een draagtijd van 7 weken tot 5 jongen geboren in de kraamburcht. Na 6 weken komen ze bovengronds. Gemiddeld wordt een das 5 jaar.



Nationaal beschermd




De **Torenvalk** is veel te vinden bij open en halfopen land. De torenvalk bouwt zelf geen nest. De soort broedt meestal 2x per jaar in nestkasten, solitaire bomen en aan de rand van bos en bosjes. De torenvalk jaagt op muizen, vogels en kuikens. Bij minder muizen, worden grote insecten gevangen. Jongen vliegen uit na een maand en worden nog weken gevoed.

Europees beschermd
Vogelrichtlijn



waterschap
 limburg

provincie limburg



Voor advies, ontwikkeling en beheer van de groene ruimte